

**CALENDARIO DELLE VACCINAZIONI PEDIATRICHE**

**Offerta attiva e gratuita**

Vaccino	3° mese	5° mese	11° mese	13° mese-15° mese	6°-7° anno	12° anno	16° anno
Difterite Tetano Pertosse	DTPa	DTPa	DTPa		DTaP IPV		dtpa
Poliomielite	IPV	IPV	IPV				
Epatite B *	HBV	HBV	HBV				
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b	Hib	Hib	Hib				
Meningococco	PNC 	PNC 	PNC 				
Pneumococco				MNC C			MNC C
Morbillo Parotite Rosolia				MPR 1	MPR 2	VAR	
Varicella							

**Per le ragazze: offerta attiva e gratuita**

Vaccino	12° anno			16° anno (fino al 2012)		
	Dosi intervallo			Dosi intervallo		
Papilloma virus umano	T <sub>0</sub>	1-2 mesi	6 mesi	T <sub>0</sub>	1-2 mesi	6 mesi
	HPV	HPV	HPV	HPV	HPV	HPV

**Offerta attiva e gratuita per gruppi a rischio. Disponibilità a prezzo di costo in tutte le altre situazioni**

Vaccino	2° mese	3° mese	5° mese	6° mese	11° mese	13° mese	24° mese	6°-7°anno	11° anno
RotaVirus	RotaV								
Varicella-						Var			

## Legenda

<b>DTPa</b>	vaccino anti-Difterite-Tetano-Pertosse acellulare – formulazione pediatrica
<b>IPV</b>	vaccino anti-Poliomielite Inattivato
<b>HBV</b>	vaccino anti-Epatite B
<b>Hib</b>	vaccino anti- <i>Haemophilus influenzae b</i>
<b>PNC 7v</b>	vaccino anti-Pneumococco coniugato eptavalente
<b>MPR</b>	vaccino anti-Morbillo-Parotite-Rosolia – MPR 1: 1 <sup>a</sup> dose – MPR 2: 2 <sup>a</sup> dose
<b>dtpa</b>	vaccino anti-difterite-tetano-pertosse acellulare - formulazione adulti
<b>MNC C</b>	vaccino anti-Meningococco C coniugato
<b>VAR</b>	vaccino anti-Varicella
<b>HPV</b>	vaccino anti-Papilloma virus umano
<b>RotaV</b>	vaccino anti-Rota Virus

**HBV \*** nei nati da madre HbsAg positiva si somministrano contemporaneamente, entro 12-24 ore dalla nascita ed in siti separati, la prima dose di vaccino HBV e una dose di immunoglobuline specifiche anti-epatite B. Il ciclo va completato da una seconda dose a 4 settimane dalla prima, da una terza dose dopo il compimento dell'ottava settimana (può coincidere con la prima somministrazione del ciclo normale) e da una quarta dose all'11° mese (può coincidere con la 3° dose del ciclo normale)

**T<sub>0</sub>** somministrazione della 1<sup>a</sup> dose (Tempo 0)  
**1-2 mesi** somministrazione della 2<sup>a</sup> dose a distanza di 1 o 2 mesi dalla 1<sup>a</sup> dose (dipende dal tipo di vaccino utilizzato)  
**6 mesi** somministrazione della 3<sup>a</sup> dose a distanza di 6 mesi dalla 1<sup>a</sup> dose

**3° mese di vita:** periodo che intercorre dal compimento della 8<sup>a</sup> settimana di vita fino alla 12<sup>a</sup> settimana di vita.

**6° anno d'età:** periodo che intercorre dal compimento dei 5 anni al compimento dei 6 anni.